

Les fiches conseils de l'UFSBD




Maladie CARDIOVASCULAIRE / CARDIAQUE (ALD) : la bouche au cœur de la santé

À savoir

Il y a une relation étroite entre la santé bucco-dentaire et les maladies cardiovasculaires.

Des études ont montré que les personnes atteintes de maladies parodontales, qui affectent les gencives et les os qui soutiennent les <u>dents</u>, sont plus susceptibles de développer des maladies cardiovasculaires que les personnes ayant des gencives saines. Il est supposé que cette association soit due à l'inflammation chronique qui peut survenir dans la bouche en raison de l'infection <u>parodontale</u>, qui peut également contribuer à la formation de plaques dans les artères et augmenter le risque de maladies cardiovasculaires.



Pour aller plus loin



Une carie non soignée tout comme une gencive

malade sont de véritables portes d'entrées pour des bactéries ou des toxines.

Les bactéries présentent dans la bouche peuvent migrer dans la circulation sanguine générale et venir se greffer sur votre cœur avec un risque d'endocardite. L'endocardite est une inflammation de la paroi qui tapisse le cœur et les maladies de la bouche sont les premières causes d'endocardite infectieuse.

Les personnes ayant une cardiopathie congénitale ont 50 fois plus de risques de développer une <u>endocardite infectieuse</u> (EI) que la population générale.

Il existe 3 groupes de patients à risque, les patients à haut risques d'El sont les suivants et ils représentent le seul groupe relavant de l'antibioprophylaxie avant certains types de soins dentaires :

- Cardiopathies cyanogènes (dérivation calo-pulmonaire partielle, anastomose de Blalock, tétralogie de Fallot non opérée)
- Prothèses valvulaires ou matériel prothétique intracardiaque (valse mécanique, bioprothèse, tube intracardiaque)
- Dispositif médical intracardiaque (pacemaker, défibrillateur)
- Antécédent d'endocardites infectieuse
- · Cardiopathies opérées avec shunt résiduel ou valvulopathie résiduelle
- · Anomalie cardiaque non opérée
- Transplantés cardiaque
- Toute cardiopathie opérée durant les 6 premiers mois post-opératoires

SI vous êtes atteint d'une cardiopathie, vous devez redoubler de vigilance et d'efficacité dans votre hygiène bucco-dentaire .

- Brossage des dents =
- o 3 fois par jour pendant 2 min
- o <u>Brosse à dents</u> à poils souples manuelle ou électrique que l'on change environ tous les 3 mois ou dès que nécessaire
- o <u>Dentifrice</u> Fluoré (1000 ou 1450 <u>ppm</u> en fonction de l'âge et du risque carieux)
- o Suivi dentiste régulier : 1 fois par an 2 fois par an
- o Nettoyage interdentaire quotidien, avec brossette, fil ou hydropulseur
- o Alimentation variée et équilibrée, pas de grignotage

Association nationale des cardiaques congénitaux (ANCC) : Ancc. asso. fr

À retenir

Il est essentiel de connaître le lien entre santé orale et risque cardiovasculaire. Pour prévenir tous les problèmes si vous êtes un patient à risque, il faut prendre soin de sa santé bucco-dentaire en se brossant les <u>dents</u> trois fois par jour ainsi que les espaces interdentaires, en ayant une alimentation équilibrée et en faisant des visites régulières chez le dentiste. En outre, pour prévenir les maladies cardiovasculaires, il est important de suivre un mode de vie sain, en faisant de l'exercice régulièrement, en mangeant une alimentation saine et en évitant le tabagisme.

6 ALD sont reconnues pour avoir des liens avec votre santé orale et plus particulièrement avec les maladies parodontales. Elles bénéficient à ce titre d'une prise en charge spécifique pour des soins parodontaux au <u>cabinet dentaire</u> depuis le 25 février 2024 (consultation <u>parodontale</u> et surfaçages parodontaux remboursés par l'Assurance Maladie).

Nos recommandations







Informations mises à jour le 30 septembre 2025